

KEUZEKAART bij een miskraam

Behandelmogelijkheden:	Afwachten	Medicatie	Operatie (curetage)
Hoe gaat het?	Je wacht tot het vruchtje vanzelf komt. Je krijgt een bloeding en buikkrampen.	Je hebt de keuze uit 2 opties: Alleen pillen die je zelf inbrengt in je vagina. Of een pil die je slikt en later de pillen die je inbrengt in je vagina. Je krijgt buikkrampen en een bloeding.	Onder narcose wordt het vruchtje met een slangetje weggezogen.
Hoe lang duurt het?	Als de bloeding is begonnen, duurt het meestal een paar dagen tot 2 weken tot het vruchtje komt.	De medicijnen beginnen meestal na 1 of 2 dagen te werken. Meestal komt het vruchtje binnen 2 dagen nadat je de pillen vaginaal hebt ingebracht.	Meestal kan de operatie binnen een week worden gepland. De operatie duurt 10 - 15 minuten. Je bent ongeveer een halve dag in het ziekenhuis, bij problemen langer.
Doet het pijn?	Soms zoals een hevige ongesteldheid, soms meer pijn.	Vaak meer pijn dan bij "afwachten".	Meestal minder pijn dan bij afwachten of medicatie.
Hoe vaak lukt het?	70 van de 100 vrouwen krijgen een complete miskraam na afwachten. 30 van de 100 krijgen alsnog medicatie of een operatie.	58 van de 100 vrouwen krijgen een miskraam na het gebruik van 1 medicijn. 85 van de 100 vrouwen krijgen een miskraam na het gebruik van 2 medicijnen.	97 tot 99 van de 100 vrouwen hebben een complete miskraam na de operatie. Bij de anderen is een 2e operatie nodig.
Kans op bloedverlies?	Kleine kans op veel bloedverlies. 1 of 2 van de 100 vrouwen moeten naar het ziekenhuis. Dan is vaak een operatie nodig.	Kleine kans op veel bloedverlies. 1 of 2 van de 100 vrouwen moeten naar het ziekenhuis. Dan is vaak een operatie nodig.	Meer kans op bloedverlies tijdens de operatie. 2 van de 100 vrouwen hebben extra bloed nodig.
Andere risico's	---	---	Gaatje in de baarmoeder. Dit komt bij 1 op de 100 vrouwen voor. Dit is meestal niet ernstig.

KEUZekaART bij een miskraam

Behandelmogelijkheden:	Afwachten	Medicatie	Operatie (curretage)
Meer kans op problemen bij een volgende zwangerschap?	Nee	Nee	Ja: <ul style="list-style-type: none">• 2 van de 100 vrouwen worden moeilijker zwanger door littekenweefsel en verklevingen in de baarmoeder.• Meer kans op een vroeggeboorte. 7 op de 100 vrouwen krijgen een vroeggeboorte na een curretage tegenover 5 op de 100 die geen curretage hebben gehad. Hoe vaker je een operatie krijgt, hoe groter de kans.
Mogelijke oorzaken?	Meestal wordt een miskraam veroorzaakt door een (genetische) afwijking bij de embryo waardoor deze niet levensvatbaar is. Vaak is de oorzaak niet te achterhalen. Na twee of meer miskramen kan je doorgestuurd worden naar de gynaecoloog om verder onderzoek te doen naar mogelijke oorzaken.		

Wanneer bellen?

06-53 64 09 79

- Als je maandverband binnen 30 minuten doordrenkt is met bloed
- Bij toenemende buikpijn
- Bij pijn tussen je schouderbladen
- Bij koorts, als je temperatuur hoger is dan 38.0 C
- Als je ongerust bent of vragen hebt